



# FARMÁCIA CEVA + LEITE

## 2025



# SUMÁRIO

## **Convalescença de Enfermidades e Reativador Metabólico**

**Pág. 5**

## **Ceratoconjuntivite**

**Pág. 6**

- Lacrimejamento (olho escorrendo)
- Olhos vermelhos
- Olhos inchados
- Mancha branca nos olhos

## **Diarreia – Bezerras (os) – Opção 01**

**Pág. 7**

## **Diarreia – Bezerras (os) – Opção 02**

**Pág. 8**

- Fezes amolecidas, brancas, amareladas, acinzentadas
- Traseiro sujo com fezes
- Febre
- Desidratação (olho fundo)
- Depressão (triste, não mama)

## **Diarreia – Animais Adultos – Opção 01**

**Pág. 9**

## **Diarreia – Animais Adultos – Opção 02**

**Pág. 10**

- Fezes amolecidas, líquidas
- Febre
- Desidratação (olho fundo)
- Traseiro sujo de fezes

## **Infecção do umbigo – Opção 01**

**Pág. 11**

## **Infecção do umbigo – Opção 02**

**Pág. 12**

- Umbigo inchado, dolorido
- Umbigo com presença de pus/secreções

## **Pneumonia – Bezerras e Novilhas – Opção 01**

**Pág. 13**

**Pneumonia – Vacas em Lactação - Opção 01**

**Pág. 15**

**Pneumonia – Vacas em Lactação - Opção 02**

**Pág. 16**

- Febre
- Descarga nasal (nariz escorrendo)
- Lacrimejamento (olhos escorrendo)
- Depressão (cabeça e orelhas baixas, baixa ou ausência de resposta a estímulos)
- Respiração difícil
- Tosse, roncos
- Cansaço

**Infecção dos Pés e Cascos  
(Pododermatites) Vacas na Secagem**

**Pág. 17**

- Manqueira
- Ferimento entre os dedos (gabarro), acima ou embaixo (sola) dos cascos
- Bicheira no local da lesão

**Infecção dos Pés e Cascos (Pododermatites)  
Vacas em Lactação**

**Pág. 18**

- Manqueira
- Ferimento entre os dedos (gabarro), acima ou embaixo(sola) dos cascos
- Bicheira local

**Retenção de Placenta e Infecções Uterinas**

**Pág. 19**

- Placenta fica presa após 12 horas da parição
- Corrimento uterino escuro, amarelado e com mau cheiro

**Mastite (Mamite) – Grau 1**

**Pág. 20**

- Alterações no leite (ralo, presença de sangue, pus, grumos), úbere normal

**Mastite (Mamite) – Grau 2**

**P**

## **Mastite (Mamite) – Grau 3**

**Pág. 22**

- Febre
- Falta de apetite
- Ausência da produção de leite ou secreção alterada
- Quarto mamário afetado, quente, dolorido, avermelhado ou azulado, inchado
- Depressão (cabeça e orelhas baixas, olhar triste)
- Desidratação (olhar fundo)

## **Timpanismo e Desordens Digestivas (Empanzinamento)**

**Pág. 23**

- Vazio do lado esquerdo inchado
- As vezes dificuldade respiratória
- Diarreia com mau cheiro

## **Tripanossomose (Secadeira)**

**Pág. 24**

- Febre
- Anemia
- Queda na produção de leite
- Emagrecimento
- Falta de apetite (sobras no cocho)
- Apetite depravado (ingestão de terra, pedaços de tijolo, etc.)
- Depressão (cabeça e orelhas baixas, olhar triste)
- Aborto, repetição ou ausência de cios
- Nascimento de crias fracas que podem morrer em poucos dias
- Dificuldade de locomoção, quedas

## **Tristeza Parasitária (Tristezinha, Boca Branca, Mal Triste)**

**Pág. 25**

- Febre
- Anemia, amarelão
- Falta de apetite
- Depressão (cabeça e orelhas baixas, olhar triste)
- Urina escura as vezes
- Cansaço

## **Soro**

**Pág. 26**

## **Secagem**

# CONVALESCENÇA DE ENFERMIDADES E REATIVADOR METABÓLICO



## Roboforte® Injetável

### Dose / Via Aplicação

1 mL/20 Kg P.V., SC.

### Nº Tratamentos

1 vez ao dia por 3 dias

### Benefícios

- Rápido aporte de energia
- Auxílio ao sistema imune
- Auxílio ao rápido retorno ao sistema de produção

### Carências

Leite: ZERO

Abate: ZERO



Retornar ao Sumário



# CERATOCONJUNTIVITE

- Lacrimejamento (olho escorrendo)
- Olhos vermelhos
- Olhos inchados
- Mancha branca nos olhos



**Marbox®**



**Ketofen® 10%**

## Dose / Via Aplicação

2 mL/25 Kg P.V., IM.

1 mL/33 Kg P.V., IM.  
(3 mL/100 Kg P.V., IM.)

## Nº Tratamentos

Dose única

Dose única.  
Se necessário repetir  
por mais 2 dias.

## Carências

Leite: 2 dias  
Abate: 3 dias

Leite: ZERO  
Abate: ZERO



Retornar ao Sumário



# DIARREIA – BEZERRAS (OS)

## O P Ç Ã O 1

- Fezes amolecidas, brancas, amareladas, acinzentadas
- Traseiro sujo com fezes
- Febre
- Desidratação (olho fundo)
- Depressão (triste, não mama)



**Zeleris®**

### Dose / Via Aplicação

1 mL/10 Kg P.V.; SC.  
(10 mL/100 Kg P.V., IM.)

### Nº Tratamentos

Dose única

### Carências

Leite: Não usar nas vacas em lactação  
Abate: 56 dias



Retornar ao Sumário













































